



Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10 %

Wirkstoff: Salicylsäure

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.-

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10% und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10 % beachten?
3. Wie ist Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10% anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10% aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10 % und wofür wird es angewendet

Anwendungsgebiete: Vermehrte Hornhautbildung (Hyperkeratosen), Hühneraugen (Clavus), Schwielen (Kallus).

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10 % beachten?

Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10 % darf nicht angewendet werden;

- wenn Sie (allergisch) gegen Salicylsäure oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Kontaktüberempfindlichkeit,
- bei Säuglingen,
- bei eingeschränkter Nierenfunktion.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10 % darf nicht mit Schleimhäuten und Augen in Berührung gebracht werden.

Anwendung von Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaseline 10 % mit anderen Arzneimitteln:

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer, an gleicher Stelle aufgetragener Arzneimittel verstärken. Vom Körper aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Nicht während der Schwangerschaft anwenden.

Keine Anwendung im Brustbereich während der Stillzeit.

Zur Behandlung von Hühneraugen nur für Flächen bis 5 cm² verwenden.



3. Wie ist Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaselin 10 % anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt: 1-2 x täglich auf die Haut auftragen.

Maximale Tagesdosis für Erwachsene: weniger als 20 g (weniger als 2 g Wirkstoff).

Maximale Tagesdosis für Jugendliche ab 12 Jahren: höchstens 2 g (weniger als 0,2 g Wirkstoff).

Art der Anwendung: Zum Auftragen auf die Haut.

Dauer der Anwendung: Nicht länger als eine Woche anwenden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Auf den Stellen, an denen Hornhaut-Salbe aufgetragen wurde, kann es zu Hautreizungen kommen.

In sehr seltenen Fällen kann es zu einer vorher nicht bekannten Überempfindlichkeit (Kontaktsensibilisierung) gegenüber Salicylsäure kommen.

Meldungen von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaselin 10 % aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses-Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen: Nicht über 25 °C aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/ärzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1 g Salbe enthält: Wirkstoff: 0,1 g Salicylsäure.

Sonstige Bestandteile: Dünnlüssiges Paraffin, Weißes Vaselin.

Erhältliche Packungsgröße: Hornhaut-Salbe Salicyl-Vaselin 10 % ist in der Originalpackung mit 90 g erhältlich.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2021.

PB0222

Art.-Nr.: 894

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.